

OP SEPT

Poly-Alcohol-Hände-Antisepticum

Zusammensetzung:

100 ml enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

2-Propanol 70 ml,

1,3-Butandiol 0,1 ml

Sonstige Bestandteile:

Gereinigtes Wasser, Rückfetter, Parfümöl

Darreichungsform und Inhalt:

Lösung zur Anwendung auf der Haut, 150 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml

Stoff oder Indikationsgruppe, Wirkungsweise:

Gebrauchsfertiges alkoholisches Hände- und Hautantiseptikum.

Bakterizid, fungizid, HBV/HIV-inaktivierend

Pharmazeutischer Unternehmer:

Laboratorium Dr. Deppe

Hooghe Weg 35

47906 Kempen

Anwendungsgebiete:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Auch zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen.

Gegenanzeigen:

OP-SEPT darf nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe angewendet werden. Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Es müssen keine Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Fälle von Überdosierung sind nicht bekannt.

Wechselwirkungen:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Nebenwirkungen:

Bekannte Nebenwirkungen sind mögliche Hautirritationen.

OP SEPT

Poly-Alcohol-Hände-Antisepticum

HÄNDEDESINFEKTION:

Art und Dauer der Anwendung:

Die zu desinfizierenden Hände mit der unverdünnten Lösung einreiben. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit feucht gehalten werden.

Anwendung gemäß DGHM:

Hygienische Händedesinfektion - 30 Sekunden
Chirurgische Händedesinfektion - 3 Minuten

HAUTDESINEKTION:

Art und Dauer der Anwendung:

Die zu desinfizierende Haut mit der unverdünnten Lösung einsprühen oder betupfen. Die Lösung einwirken lassen.

Anwendung gemäß DGHM:

Talgdrüsenarme Haut

- vor Injektionen und Punktionen – 15 Sekunden
- vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen sowie operativen Eingriffen – mind. 60 Sekunden

Talgdrüsenreiche Haut

- vor Punktionen und Operationen – mind. 10 Minuten, ständig feucht halten.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Zur Beachtung:

Alkohohlaltig, brennbar. Nicht in der Nähe offener Flammen und Heizgeräte anwenden.

Reizt die Augen, bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Zul.-Nr.:34987.00.00

Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21,5 ° C

Dieses Produkt wurde hergestellt in Übereinstimmung mit dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9002 und DIN EN 46002. DGHM, RKI (§18 ISSG) – gelistet.